

# GOED GEVOED OUDER WORDEN

## Ondervoeding bij ouderen

#WTO2023

WEEK TEGEN  
ONDERVOEDING

### Voorkomen, herkennen en behandelen

#### Wat is ondervoeding?



Ondervoeding is een aandoening die wordt veroorzaakt door een verminderde inname of opname van voeding met als gevolg een veranderde lichaamssamenstelling (afname spiermassa). Dit resulteert in een afname van het fysiek en mentaal functioneren en een slechtere klinische uitkomst van ziekte.

#### Hoe vaak komt (hoog risico op) ondervoeding voor?

- Bij 38% van de ouderen bij opname op de geriatrie afdeling in het ziekenhuis.
- Bij 15-20% van de ouderen bij opname in een verpleeghuis.
- Bij 8,5% van de thuiswonende 65-plussers.\*
- Bij 16% van de thuiswonende kwetsbare 65-plussers. Denk aan ouderen met thuiszorg, slechte eetlust, mobiliteitsbeperking, alleenwonend of boven 85 jaar.\*

#### Wat zijn de gevolgen?

Afname van ...



Algehele conditie  
Respons op medische behandeling  
Wondgenezing  
Immuunsysteem  
Zelfredzaamheid  
Evenwicht en mobiliteit

Toename van ...



Vermoeidheid  
Risico op vallen en fracturen  
Kans op decubitus en depressie  
Kans op vervroegd overlijden

Toename van  
zorgvraag en zorgkosten

#### Wat kun jij doen?

Hoe eerder (een risico) op ondervoeding wordt gesignaleerd, hoe beter het te behandelen is. Voorkomen is nog beter.



Let op risicofactoren, zoals lusteloosheid, minder eetlust en kauw-, slikproblemen of gebitsproblemen



Informeer naar onbedoeld gewichtsverlies en voedingsinname



Screen het risico op ondervoeding



Bespreek klachten zoals pijn, darmproblemen, misselijkheid, smaak- en reukveranderingen



Ondersteun een goede en gevarieerde voedingsinname



Stimuleer bewegen



Werk samen, zoals met arts, diëtist, (praktijk)verpleegkundige en verzorgende

#### Fit en krachtig door goede voeding en bewegen



Goede voeding met voldoende eiwitten, energie (kilocalorieën) en beweging dragen bij aan het behoud van spiermassa, -kracht en conditie. Per maaltijdmoment wordt minimaal 25 gram eiwit aangeraden.



Eiwitrijke producten zijn: melk, yoghurt, kwark, skyr, kaas, eieren, vlees(vervangers), vis, gevogelte, noten en pinda's, soja-producten en peulvruchten.

\*Zügül, Van Rossem en Visser (2023). Prevalence of Undernutrition in Community-Dwelling Older Adults in The Netherlands: Application of the SNAQ65+ Screening Tool and GLIM Consensus Criteria

# Prognose voor ondervoeding bij ouderen

Door de groei in het aantal ouderen én de stijgende levensverwachting, neemt het aantal ouderen sterk toe. In 2040 zijn er naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers. Het aantal ouderen met ondervoeding zal dus toenemen, mede doordat zij langer zelfstandig thuis (moeten blijven) wonen.

## Voorlichting om ondervoeding te voorkomen



Goede voorlichting is essentieel. Vertel je cliënten daarom...

- > Dat ondervoeding met het stijgen van de leeftijd vaak voorkomt, maar niet wenselijk is
- > Dat onbedoeld gewichtsverlies óók verlies is van spiermassa
- > Dat ondervoeding (ook bij overgewicht) negatieve gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren en de zelfredzaamheid
- > Dat voedzaam en gevarieerd eten juist als je ouder bent noodzakelijk is
- > Dat eiwitrijke producten belangrijk zijn om verlies van kracht en spiermassa tegen te gaan en welke producten veel eiwitten bevatten
- > Dat bewegen belangrijk is, voor het behoud van spieren en het soepel houden van de gewrichten
- > Welke voorzieningen er landelijk en/of lokaal zijn zoals maaltijdservice, boodschappenservice, buurtrestaurants of andere passende wijkinitiatieven

Geef je cliënt de brochure Goed Gevoed Ouder Worden of verwijst naar [goedgevoedouderworden.nl](http://goedgevoedouderworden.nl). Op deze website kun je ook samen met je cliënt een van de zelftesten invullen.



## Extra risico op ondervoeding



Wees extra alert als iemand net ontslagen is uit het ziekenhuis, recent de partner heeft verloren, niet of nauwelijks buiten komt, moeite heeft met lopen, een groot deel van de dag zit, klachten heeft als pijn, angst of koorts of eenzaam is.

## Oorzaken van ondervoeding



**Somatische factoren:** achteruitgang van zintuigen, slechte eetlust, gebitsklachten of andere kauw- of slikproblemen, pijn, misselijkheid, braken, obstipatie, diaree, hoog medicijngebruik, het hebben van een ziekte, waaronder dementie.



**Functionele factoren:** verminderde mobiliteit, verminderde of geen mogelijkheid om boodschappen te doen en eten te bereiden en vermoeidheid.



**Psychische problemen:** angst, stress, rouwverwerking, depressieve klachten en verminderde cognitie.



**Sociale factoren:** alleen wonend, geen of een klein sociaal netwerk, eenzaamheid, ontbreken mantelzorg en financiële problemen.

## Zo screen je (het risico op) ondervoeding



Gebruik de screeningsinstrumenten voor je zorgsector op [kenniscentrumondervoeding.nl/screening-en-diagnostiek](http://kenniscentrumondervoeding.nl/screening-en-diagnostiek).

Schakel bij een verhoogd risico een diëtist in.



## Dieetbehandeling is maatwerk



De behandeling van ondervoeding is maatwerk. De diëtist zal in overleg met de cliënt, patiënt de voeding optimaliseren, rekening houdend met zijn/haar voorkeuren en gewoonten. Het uitgangspunt is minimaal 25 gram eiwit per maaltijdmoment. Als met gewone en eiwitrijke voedingsmiddelen de behandeldoelen niet gehaald kunnen worden is gebruik van voeding voor medisch gebruik geïndiceerd.

## Over Kenniscentrum Ondervoeding

Het Kenniscentrum Ondervoeding biedt informatie en ondersteuning voor de bewustwording, preventie, signalering en behandeling van ondervoeding in alle sectoren van de zorg voor alle doelgroepen: van jong tot oud.

Ga voor meer informatie naar: [kenniscentrumondervoeding.nl](http://kenniscentrumondervoeding.nl). Op [goedgevoedouderworden.nl](http://goedgevoedouderworden.nl) vinden ouderen en hun naasten zelftesten en informatie over goed eten en drinken.

