

Ruotare il disco in modo che la statura corrisponda al peso corporeo. La freccia rossa indica il valore IMC.

Ponetevi le seguenti domande

Avete perso peso non intenzionalmente ?

▶ più di 6 kg negli ultimi 6 mesi



▶ più di 3 kg nel mese scorso



Avete avuto bisogno di assistenza per mangiare ?



Avete constatato una perdita dell'appetito nel mese scorso ?



Valori dell'IMC

IMC inferiore a 20, luce rossa



IMC tra 20 e 22, luce arancione



IMC tra 22 e 28, luce verde



IMC superiore a 28 indica un sovrappeso


Totale dei risultati delle domande + IMC




Identificare e pesare* al ricovero e prima di ogni consultazione multidisciplinare (MDO)

Annotare i risultati nel programma (personalizzato) di trattamento

 Nessun intervento




 Somministrazione spuntini tra i pasti 2-3 x al giorno

- Motivare, event. brochure
- Controllo globale dell'assunzione

 Somministrazione spuntini tra i pasti 2-3 x al giorno + pasti principali + controllo globale dell'assunzione

- Informare il medico dell'eventuale intervento di un dietista
- ≤ 3 giorni lavorativi dopo lo screening, consulto con un dietista
- ≤ 8 giorni lavorativi dopo lo screening, inizia il trattamento
- 5 giorni dopo l'inizio del trattamento, valutazione

* Pesare

-  1x ogni 1-3 mesi
-  1x al mese
-  1x al mese

Screening e trattamento precoce della malnutrizione in case di cura e residenze sanitarie

